【SR-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	がん薬物療法に伴うEVに関する合同ガイドライン
対象	がん薬物療法に伴うEVが生じた者
介入	ステロイド軟膏塗布
対照	ステロイド軟膏塗布しない

＊バイアスリスク，非直接性
各ドメインの評価は「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
まとめは「高（−2）」，「中（−1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
＊＊上昇要因
各項目の評価は「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階。
まとめは「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体

アウトカム	研究数	研究デザイン／	＊バイアスリスク	＊非一貫性	＊不精確性	＊非直接性	＊その他（出版バイアスなど）	＊上昇要因（観察研究）	リスク人数（アウトカム率） 対照群分母	対照群分子	（%）	介入群分母	介入群分子	（%）	効果指標（種類）	効果指標統合値	95%信頼区間	＊＊エビデンスの強さ	＊＊＊重要性	コメント
外科的処置（デブリ・植皮）	症例報告/1	0	0	0	-1	0	1	NA	NA	NA	2	2	100	NA	NA	NA	非常に弱い（D）	9	
回復までの日数	症例報告/9	0	-1	0	0	0	1	NA	NA	NA	24	23	95.8	NA	NA	NA	弱い（C）	6	
塗布部の皮膚障害(局所感染,皮膚委縮,毛細血管拡張等)	症例報告/1	0	-1	0	0	0	1	NA	NA	NA	1	1	100	NA	NA	NA	非常に弱い（D）	6	

コメント（該当するセルに記入）